Укажите свой номер:

Билет № 29

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при явном повреждении позвоночника в бессознательном состоянии?**



1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется артериальное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе плечевой кости.**

1	Наложить шину с внутренней стороны плеча и туго прибинтовать руку к туловищу.
2	Рука согнута в локте; шина идёт от кончиков пальцев до угла лопатки ее здоровой руки с валиком в подмышечной области и в ладони.
3	Наложить шину от кисти до плечевого сустава.

4 **Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?**

1	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожжённые участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питьё. При потере сознания сделать искусственное дыхание.
3	Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.

5 **Какую повязку использую при травме носа?**

1	Колосовидную.
2	Пращевидную.
3	Циркулярную.

6 **В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами рёбер и грудины?**

1	Лёжа на боку.
2	Лёжа на спине.
3	Полусидя.

7 **Укажите когда нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля.**

1	Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля).
2	Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации.
3	Неблагоприятные погодные условия (сильная жара, холодное время года).
4	При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжёлую вторичную травму.

8 **Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?**

1	Уложить на спину, приподнять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить, дать выпить корвалол.

9 **Как снять с пострадавшего высокий сапог?**

1	Стянуть.
2	Разрезать спереди.
3	Разрезать сзади по шву.

10 **Укажите для чего предназначен валидол.**

1	Для приёма при высокой температуре.
2	Для приёма при болях в области перелома.
3	Для приёма при болях в области сердца.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 28

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при явном повреждении позвоночника в бессознательном состоянии?**



1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется венозное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Как правильно выбрать место для наложения кровоостанавливающего жгута на конечности?**

1	Выше раны.
2	На область раны.
3	Ниже раны.

4 **Как нужно начинать бинтовать грудную клетку при ранении?**

1	На выдохе с нижних отделов грудной клетки.
2	На вдохе с середины грудной клетки.
3	На выдохе от подмышечных ямок.

5 **Первую доврачебную помощь имеют право оказывать:**

1	Случайный прохожий.
2	Сотрудник ГИБДД.
3	Врач.
4	Все вышеперечисленные.

6 **Какая повязка накладывается при повреждении пальца?**

1	Пращевидная.
2	Спиральная.
3	Шапочка.

7 **Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2	Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3	Синяки, ссадины на коже.

8 **Укажите как оказать помощь пострадавшему при закрытом переломе костей черепа, если он без сознания.**

1	Надеть шейный воротник, уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенным вокруг неё валиком из одежды, приложить холод.
2	Уложить пострадавшего на спину, дать питьё, на голову положить компресс.
3	Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик.

9 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени.**

1	Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава.
2	Наложить две шины с наружной и внутренней стороны ноги от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов.
3	Наложить одну шину с внутренней стороны ноги от стопы до коленного сустава.

10 **Какие средства можно применить для уменьшения боли при переломе?**

1	Валидол.
2	Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.
3	Корвалол.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 27

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при ранении конечностей? Пострадавший находится в сознании:**



1	Только на рисунке 1.
2	Только на рисунке 2.
3	На рисунках 1и 2.

2 **Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

3 **На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) при артериальном кровотечении летом?**

1	Не более 2,5 часов.
2	Не более 1 часа.
3	Не более 2 часов.

4 **Какая повязка накладывается на плечо?**

1	Колосовидная.
2	Шапочка.
3	Спиралевидная.

5 **Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?**

1	Обложить голень валиками из одежды.
2	Прибинтовать к здоровой ноге.
3	Туго забинтовать.

6 **В каком положении нужно эвакуировать пострадавшего с вывихами костей верхних конечностей?**

1	Лёжа.
2	Стоя.
3	Сидя.

7 **Как снять с пострадавшего высокий сапог?**

1	Стянуть.
2	Разрезать спереди.
3	Разрезать сзади по шву.

8 **Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?**

1	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожжённые участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питьё. При потере сознания сделать искусственное дыхание.
3	Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.

9 **Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?**

1	Уложить на спину, поднять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить, дать выпить корвалол.

10 **В каких случаях применяется энтеродез или активированный уголь?**

1	При болях в животе.
2	При высокой температуре.
3	При отравлении.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 26

1 **На каком рисунке правильно показан метод восстановления дыхания и кровообращения у пострадавшего?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения.**

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

3 **Какой метод остановки кровотечения необходимо применять в первую очередь при артериальном кровотечении?**

1	Жгут (закрутка).
2	Метод максимального сгибания конечности.
3	Пальцевое прижатие сосуда.

4 **Первая помощь при закрытой травме органов брюшной полости:**

1	Обезболивание.
2	Обильное питьё, успокоительные препараты.
3	Положить холод на живот, срочная госпитализация.

5 **При оказании первой доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

6 **Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном ушибе живота?**

1	Уложить пострадавшего на спину, дать тёплый чай и в этом положении транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2	Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учреждение в положении лёжа на боку с согнутыми в коленях ногами.
3	Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до ближайшего медицинского учреждения.

7 **Какая повязка накладывается при проникающих ранениях глазного яблока?**

1	Спиралевидная.
2	Бинокулярная.
3	Теплоизолирующая.

8 **Укажите подручные средства, имитирующие мягкие носилки.**

1	Широкие доски, двери.
2	Покрывало, большой кусок плотной ткани, одеяло.
3	Всё перечисленное.

9 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости.**

1	Наложить сбоку одну шину от стопы до середины бедра.
2	Наложить три шины: одну по задней поверхности ноги – от поясницы до кончиков пальцев, вторую – сбоку, от стопы до подмышечной впадины, третью – внутри, от стопы до паха.
3	Наложить по бокам две шины – от стопы до конца бедра.

10 **Укажите для чего применяется S-образная трубка.**

1	Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2	Чтобы напоить пострадавшего, для предупреждения рвотных масс.
3	Для проведения искусственного дыхания, для устранения западения языка, для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 25

1 **На каком рисунке наиболее правильно показана остановка кровотечения у пострадавшего?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки капиллярного кровотечения.**

1	Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложить давящую повязку на место ранения.
3	Применяют оба способа.

3 **Как закрывают раны на доврачебном этапе?**

1	Сухими асептическими повязками.
2	Полуспиртовыми повязками.
3	Марлевыми повязками.

4 **Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами?**

1	Промыть поражённое место мыльным раствором или 2% раствором столовой соды, наложить асептическую повязку.
2	Обработать поражённое место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
3	Промыть поражённое место водой и наложить повязку из чистой материи.
4	Применяют способы 2 или 3.

5 **Какой метод остановки кровотечения необходимо применять в первую очередь при артериальном кровотечении?**

1	Жгут (закрутка).
2	Метод максимального сгибания конечности.
3	Пальцевое прижатие сосуда.

6 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

7 **Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей шины?**

1	Да.
2	Нет.
3	Одежду нужно снимать только ниже пояса.

8 **Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?**

1	Колосовидная.
2	Спиралевидная.
3	Чепец.

9 **Как оказать первую помощь при переломе костей таза?**

1	Придать пострадавшему положение полусидя, наложить тугую повязку.
2	Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, подложить валик из одежды под слегка согнутые и разведённые коленные суставы, фиксировать стопы.
3	Уложить пострадавшего на спину на носилки, к местам повреждения приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой.

10 **Укажите для каких целей предназначен раствор йода или бриллиантовой зелени.**

1	Для обработки кожи вокруг раны.
2	Для обработки всей поверхности раны.
3	При ожогах, вызванных щёлочью.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 24

1 **На каком рисунке наиболее правильно показан метод остановки артериального кровотечения из раны:**



Рис. 1

Рис. 2

1	На рисунках 1 и 2.
2	На рисунке 1.
3	На рисунке 2.

2 **Виды кровотечений.**

1	Из носа, руки, головы, ноги, тела.
2	Артериальное, венозное, капиллярное, смешанное, внутреннее.
3	Артериальное, венозное, капиллярное.

3 **Какие приёмы первой медицинской помощи применяются при внутреннем кровоизлиянии или подозрении на него?**

1	Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную повязку, обеспечить покой.
2	Дать холодной воды.
3	Дать горячего чая.

4 **Как правильно применить бактерицидные салфетки?**

1	Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку.
2	Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку.
3	На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или бинтом.

5 **Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой?**

1	Промыть пораженное место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
2	Промыть пораженный участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, наложить асептическую повязку.
3	Промыть пораженный участок водой и наложить повязку из чистой материи.
4	Применяют способы 2 или 3.

6 **Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности?**

1	Вправление, обезболивание, иммобилизация.
2	Иммобилизация, обезболивание, холод на место вывиха.
3	Обезболить, наложить транспортную шину, доставить в медицинское учреждение.

7 **Какая повязка накладывается при повреждении пальца?**

1	Пращевидная.
2	Спиральная.
3	Шапочка.

8 **Основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах:**

1	Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца.
2	Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха.
3	Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить холодный компресс на грудь.

9 **Какое лекарственное растение можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?**

1	Подорожник, берёзовый лист.
2	Корень валерианы, цветы ландыша.
3	Листья мать-и-мачехи.

10 **Для чего предназначен нашатырный спирт?**

1	Для обработки ран.
2	Для наложения согревающего компресса.
3	Для вдыхании при обмороке и угаре.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 23

1 **На каком рисунке правильно показан приём извлечения пострадавшего из автомобиля при повреждении у него позвоночного столба?**

1	Только на рисунке 1.
2	Только на рисунке 2.
3	На рисунках 1 и 2.

2 **Чем характеризуется капиллярное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) при артериальном кровотечении зимой?**

1	Не более 2,5 часов.
2	Не более 30 минут.
3	Не более 2 часов

4 **Какие признаки открытого перелома?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности
2	Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров.
3	Синяки, ссадины на коже.

5 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени.**

1	Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава.
2	Наложить две шины с наружной и внутренней стороны ноги от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов.
3	Наложить одну шину с внутренней стороны ноги от стопы до коленного сустава.

6 **Какая повязка накладывается при повреждении бедра?**

1	Чепец.
2	Дезо.
3	Спиралевидная (ползучая).

7 **Как правильно снять с пострадавшего куртку при ранении руки?**

1	Снять одежду сначала с поврежденной руки.
2	Снять одежду с начала со здоровой руки.
3	Снимать одежду одновременно с двух рук.

8 **Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

9 **Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполненные сукровицей (кровянистой жидкостью) или некроз тканей?**

1	Первой степени.
2	Второй степени.
3	Третьей степени.

10 **Укажите для чего применяется S-образная трубка.**

1	Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2	Чтобы напоить пострадавшего, для предупреждения рвотных масс.
3	Для проведения искусственного дыхания, для устранения западения языка, для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 22

1 **На каком из рисунков наиболее правильно показан метод остановки кровотечения из носа?**

Рис. 1 Рис. 2

1	На рисунке 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется венозное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения?**

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

4 **Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2	Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3	Синяки, ссадины на коже.

5 **Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?**

1	Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности.
2	Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой конечности.
3	Наложить на рану стерильную повязку, провести транспортную иммобилизацию конечности, дать обезболивающее лекарство и организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

6 **Первую доврачебную помощь имеют право оказывать:**

1	Случайный прохожий.
2	Сотрудник ГИБДД.
3	Врач.
4	Все вышеперечисленные.

7 **Как оказать помощь при ожогах?**

1	Вскрыть пузыри, наложить мазевую поверхность.
2	Не вскрывая пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3	Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную повязку.

8 **Какая повязка накладывается при повреждении затылка?**

1	Чепец.
2	Спиралевидная.
3	Расходящаяся.

9 **Перечислите мероприятия первой помощи пострадавшему с переломом костей стопы.**

1	Дать обезболивающие лекарства, транспортировать в больницу.
2	Шинировать, обезболить, транспортировать.
3	Транспортировать, обезболить, шинировать.

10 **Какое средство нужно применять при стрессовой реакции?**

1	Развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и дать выпить больному.
2	Дать больному под язык таблетку валидола.
3	Дать больному таблетку анальгина.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 21

1 **На каком из рисунков наиболее правильно показан метод остановки кровотечения из носа?**



Рис. 1 Рис. 2

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Как правильно выбрать место для наложения кровоостанавливающего жгута на конечности?**

1	Выше раны.
2	На область раны.
3	Ниже раны.

3 **По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?**

1	Бледность и влажность кожных покровов, слабость, частый пульс, изменение сознания.
2	Высокая температура, судороги, частый пульс.
3	Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.

4 **По каким признакам можно заподозрить перелом ребер?**

1	Боль в месте травмы при дыхании, кашле, движениях; смещение, хруст отломков и резкая локальная болезненность в месте перелома при ощупывании.
2	Боль в грудной клетке постоянного характера, независимая от положения пострадавшего и акта дыхания.
3	Одышка, кашель без локальной болезненности в грудной клетке.

5 **Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?**

1	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожжённые участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питьё. При потере сознания сделать искусственное дыхание.
3	Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.

6 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе плечевой кости.**

1	Наложить шину с внутренней стороны плеча и туго прибинтовать руку к туловищу.
2	Рука согнута в локте; шина идёт от кончиков пальцев до угла лопатки ее здоровой руки с валиком в подмышечной области.
3	Наложить шину от кисти до плечевого сустава.

7 **В каком положении транспортируют пострадавшего с подозрением на травму позвоночника?**

1	Лёжа на спине на мягких носилках с надетым шейным воротником.
2	Лёжа на боку с надетым шейным воротником.
3	Лёжа на спине на жестких носилках с надетым шейным воротником.

8 **Какую повязку использую при травме носа?**

1	Колосовидную.
2	Пращевидную.
3	Циркулярную.

9 **При оказании первой медицинской помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

10 **Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?**

1	Панадол, кетарол.
2	Димедрол, валериана.
3	Фталазол, пенициллин.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 20

На каком рисунке правильно показан приём извлечения пострадавшего из автомобиля при повреждении у него позвоночного столба?

1	Только на рисунке 1.
2	Только на рисунке 2.
3	На рисунках 1 и 2.

Укажите правильный способ остановки капиллярного кровотечения.

1	Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложить давящую повязку на место ранения.
3	Применяют оба способа.

Какой метод остановки кровотечения необходимо применять в первую очередь при артериальном кровотечении?

1	Жгут (закрутка).
2	Метод максимального сгибания конечности.
3	Метод пальцевого прижатия.

Как правильно наложить повязку при проникающем ранении грудной клетки?

1	Наложить асептическую повязку на рану.
2	На рану наложить толстую ватно-марлевую салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым материалом и фиксировать поддерживающей повязкой.
3	Наложить максимально тугую повязку.

Какая повязка накладывается при повреждении лба?

1	Шапочка.
2	Спиралевидная.
3	Крестообразная.

Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки?

1	Применяют повязку Дезо.
2	Применяют спиралевидную повязку.
3	Применяют оба способа.

Как оказать помощь пострадавшему, упавшему в обморок?

1	Уложить на спину, приподнять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить, дать корвалол.

При оказании первой медицинской помощи необходимо работать в перчатках:

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

Как оказать первую помощь при наличии неглубокой раны (ссадины)?

1	Наложить стерильную повязку.
2	Промыть рану лекарствами.
3	Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.

Укажите для чего применяется S-образная трубка.

1	Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2	Чтобы напоить пострадавшего, для предупреждения рвотных масс.
3	Для проведения искусственного дыхания, для устранения западения языка, для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 19

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при значительной кровопотере?**

1

2

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения.**

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

3 **Что нужно указать в записке при наложении жгута?**

1	Время получения травмы.
2	Время наложения жгута.
3	Время снятия жгута.

4 **В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины?**

1	Лёжа на боку.
2	Лёжа на спине.
3	Полусидя.

5 **Укажите, когда нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля.**

1	Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля).
2	Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации.
3	Неблагоприятные погодные условия (сильная жара, холодное время года).
4	При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжёлую вторичную травму.

6 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

7 **Как правильно применить бактерицидные салфетки?**

1	Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку.
2	Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку.
3	На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырём или бинтом.

8 **Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при повреждении?**

1	Спиралевидная.
2	Восьмиобразная.
3	Колосовидная.

9 **Перечислите мероприятия доврачебной помощи пострадавшему с переломом костей стопы.**

1	Дать обезболивающие лекарства, транспортировать в больницу.
2	Шинировать, обезболить, транспортировать.
3	Транспортировать, обезболить, шинировать.

10 **Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?**

1	Панадол, кеторал.
2	Димедрол, валериана
3	Фталазол, пенициллин.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 18

1 **На каком рисунке наиболее правильно показан метод остановки артериального кровотечения из раны?**



Рис. 1

Рис. 2

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется артериальное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?**

1	Бледная и холодная кожа, пот, слабость, частый пульс, низкое давление, заторможенное или спутанное сознание.
2	Частый пульс, высокая температура, судороги.
3	Резкая сильная боль, появление припухлости, потеря сознания.

4 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости.**

1	Наложить сбоку одну шину от стопы до середины бедра.
2	Наложить три шины: одну по задней поверхности ноги – от поясницы до кончиков пальцев, вторую – сбоку, от стопы до подмышечной впадины, третью – внутри, от стопы до паха.
3	Наложить по бокам две шины – от стопы до конца бедра.

5 **Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца?**

1	Дать принять одну таблетку анальгина.
2	Дать понюхать нашатырного спирта.
3	Дать принять под язык таблетку валидола или 15 капель корвалола, разведённого в 50 мл воды.

6 **Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?**

1	Колосовидная.
2	Спиралевидная.
3	Чепец.

7 **Как оказать помощь при ожогах?**

1	Вскрыть пузыри, наложить мазевую повязку.
2	Не вскрывая пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3	Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную ватно-марлевую повязку.

8 **Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2	Конечность деформирована, повреждён кожный покров, видны осколки костей.
3	Синяки, ссадины на коже.

9 **Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти?**

1	Сидя.
2	Лёжа на спине.
3	Лёжа на боку.

10 **Для чего нужен эластичный трубчатый бинт?**

1	Для фиксации иммобилизирующих шин.
2	Для наложения пращевидных повязок.
3	Для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер: _____

Билет № 17

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при открытом ранении брюшной полости?**

1	На рисунке 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется венозное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **На какой предельный срок времени можно наложить жгут(закрутку) при артериальном кровотечении летом?**

1	Не более 2,5 часов.
2	Не более 1 часа.
3	Не более 2 часов.

4 **Основные правила оказания 1-ой медицинской помощи при травматическом шоке:**

1	Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду или ослабить её давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи.
2	Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить тёплые примочки на лоб и затылок.
3	Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. Прекратить воздействие травмирующих факторов. Остановить сильное кровотечение. Восстановить нарушенное дыхание и сердечную деятельность (реанимационное пособие). Наложить на рану стерильную (чистую) повязку. Провести транспортную иммобилизацию (борьба с болью). Придать пострадавшему функционально выгодное положение. Постоянно контролировать состояние пострадавшего.

5 **Первая доврачебная помощь при общем переохлаждении:**

1	Растереть пострадавшего жёстким материалом или снегом.
2	Создать условия для общего согревания, укутать одеялом, дать тёплое питьё.
3	Сделать массаж, растереть спиртом.

6 **Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном ушибе живота?**

1	Уложить пострадавшего на спину, дать тёплый чай и в этом положении транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2	Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учрежение в положении лёжа на боку с согнутыми в коленях ногами.
3	Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до ближайшего медицинского учреждения.

7 **Как правильно применить бактерицидные салфетки?**

1	Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку.
2	Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку.
3	На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырём или бинтом.

8 **К здоровому образу жизни относится:**

1	Соблюдение личной гигиены.
2	Правильный режим питания.
3	Занятие спортом.
4	Всё вышеперечисленное.

9 **Какую повязку надо наложить при ранении грудной клетки?**

1	Давящую на максимальном выдохе пострадавшего.
2	Давящую на максимальном вдохе пострадавшего.
3	Поддерживающую, чтобы не затруднять дыхание пострадавшего.

10 **Какие средства можно применить для уменьшения боли при переломе?**

1	Валидол.
2	Кетарол или охлаждающий пакет-контейнер.
3	Корвалол.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 16

1 **На каком рисунке правильно показан метод восстановления дыхания и кровообращения у пострадавшего?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

3 **По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?**

1	Бледная и холодная кожа, пот, слабость, частый пульс, низкое давление, заторможенное или спутанное сознание.
2	Частый пульс, высокая температура, судороги.
3	Резкая сильная боль, появление припухлости, потеря сознания.

4 **Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами?**

1	Промыть поражённое место мыльным раствором или 2% раствором столовой соды, наложить асептическую повязку.
2	Обработать поражённое место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
3	Промыть поражённое место водой и наложить повязку из чистой материи.
4	Применяют способы 2 или 3.

5 **Как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему с травмой позвоночника?**

1	Срочно самостоятельно транспортировать его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.
2	Обеспечить пострадавшему неподвижность и безопасность. Вызвать скорую медицинскую помощь.
3	Придать выгодное физиологическое положение.

6 **Что нужно указать в записке при наложении жгута?**

1	Время получения травмы.
2	Время наложения жгута.
3	Время снятия жгута.

7 **Признаки отравления угарным газом:**

1	Тошнота, рвота, сильная головная боль, розовые кожные покровы и слизистые, потеря сознания.
2	Синюшный цвет кожных покровов и слизистых, головная боль.
3	Тошнота, рвота, понос, частый слабый пульс.

8 **В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей таза?**

1	Сидя с разведенными ногами.
2	Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в тазобедренных суставах и слегка развести.
3	Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под крестцом.

9 **Какая повязка накладывается на бедро?**

1	Чепец.
2	Колосовидная.
3	Спиралевидная (ползучая).

10 **Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка)?**

1	Для промывания глаз.
2	Для промывания желудка.
3	Для обработки краёв раны и поверхностных ран.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 15

1 **На каком рисунке правильно показан метод определения, жив или мёртв пострадавший?**

1	На рисунках 1, 2, 3.
2	На рисунке 3.
3	На рисунке 2.
4	На рисунке 1.

2 **Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения.**

1	Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности.
3	Применяются оба способа.

3 **Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?**

1	Нет.
2	Можно.
3	Только маленькими глотками.

4 **Как оказать помощь пострадавшему с болью в области сердца?**

1	Дать принять одну таблетку анальгина.
2	Дать понюхать нашатырного спирта.
3	Дать принять под язык таблетку валидола или 15 капель корвалола, разведённого в 50 мл воды.

5 **В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в суставах верхних конечностей?**

1	В положении сидя.
2	В положении лёжа.
3	В положении стоя.

6 **Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью?**

1	Первой степени.
2	Второй степени.
3	Третей степени.

7 **Перечислите мероприятия первой помощи пострадавшего с переломом костей стопы.**

1	Дать обезболивающие лекарство, транспортировать в больницу.
2	Шинировать, обезболить, транспортировать.
3	Транспортировать, обезболить, шинировать.

8 **Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?**

1	Крестообразная.
2	Спиралевидная.
3	Циркулярная.

9 **Укажите, когда нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля.**

1	Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля).
2	Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации.
3	Неблагоприятные погодные условия (сильная жара, холодное время года).
4	При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжёлую вторичную травму.

10 **Укажите для каких целей предназначен раствор йода или бриллиантовой зелени.**

1	Для обработки кожи вокруг раны.
2	Для обработки всей поверхности раны.
3	При ожогах, вызванных щёлочью.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 14

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при ранении шеи?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения.**

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

3 **Виды кровотечений:**

1	Из носа, руки, головы, ноги, тела.
2	Артериальное, венозное, капиллярное, смешанное, внутреннее.
3	Артериальное, венозное, капиллярное.

4 **Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?**

1	Уложить на спину, поднять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить, дать выпить корвалол.

5 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе ключицы.**

1	Шинирование.
2	Косыночная повязка.
3	Применяют оба способа.

6 **Какая повязка накладывается при повреждении пальца?**

1	Пращевидная.
2	Спиральная.
3	Шапочка.

7 **Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки?**

1	Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую.
2	Одежду надевают на обе руки одновременно.
3	Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку.

8 **По каким признакам можно определить перелом ребер?**

1	Боль в месте травмы при дыхании, кашле, движениях; смещение, хруст отломков и резкая локальная болезненность в месте перелома при ощупывании.
2	Боль в грудной клетке постоянного характера, независимая от положения пострадавшего и акта дыхания.
3	Одышка, кашель без локальной болезненности в грудной клетке.

9 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

10 **Какое средство нужно применять при стрессовой реакции?**

1	Развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и дать выпить больному.
2	Дать больному под язык таблетку валидола.
3	Дать больному таблетку анальгина.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 13

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при ранении позвоночника? Пострадавший находится в сознании.**



1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

3 **Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях пострадавшего, надо:**

1	Посадить.
2	Уложить, конечность приподнять.
3	Поставить на ноги.

4 **Как оказать помощь при ожогах 2-й степени?**

1	Вскрыть пузыри, положить мазевую повязку.
2	Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3	Охладить обожженную поверхность, не вскрывая пузырей, наложить стерильную ватно-марлевую повязку.

5 **Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей шины?**

1	Да.
2	Нет.
3	Одежду нужно снимать только ниже пояса.

6 **Укажите способ транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника на мягких носилках.**

1	Лёжа на спине.
2	Лёжа на животе.
3	Лёжа на боку.

7 **Какой длины должна быть шина для иммобилизации конечности?**

1	С возможностью фиксации только места перелома.
2	С возможностью фиксации места перелома и сустава выше места травмы.
3	С возможностью фиксации места перелома и суставов выше и ниже места травмы.

8 **Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя в автомобиле?**

1	Внимание снижается, а реакция не изменяется.
2	Реакция снижается, а внимание усиливается.
3	Внимание и реакция снижаются.

9 **Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?**

1	Спиралевидная.
2	Восьмиобразная.
3	Колосовидная.

10 **Для чего нужен эластичный трубчатый бинт?**

1	Для фиксации иммобилизирующих шин.
2	Для наложения пращевидных повязок.
3	Для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 12

1 **На каком рисунке наиболее правильно показана остановка кровотечения у пострадавшего?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Какое кровотечение считается наиболее опасным?**

1	Капиллярное.
2	Венозное.
3	Артериальное.

3 **По каким признакам можно определить перелом ребер?**

1	Боль в месте травмы при дыхании, кашле, движениях; смещение, хруст отломков и резкая локальная болезненность в месте перелома при ощупывании.
2	Боль в грудной клетке постоянного характера, независимая от положения пострадавшего и акта дыхания.
3	Одышка, кашель без локальной болезненности в грудной клетке.

4 **Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении головного мозга.**

1	Положение сидя, холод на голову, госпитализация.
2	Положение лёжа на спине с приподнятым плече – головным концом туловища и надетым шейным воротником, если пострадавший в сознании; лёжа на боку, если пострадавший без сознания; холод на область головы; госпитализация.
3	Положение стоя, холод на голову, госпитализация.

5 **Укажите, когда нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля.**

1	Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля).
2	Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации.
3	Неблагоприятные погодные условия (сильная жара, холодное время года).
4	При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжёлую вторичную травму.

6 **Каковы признаки термического ожога 1-й степени?**

1	Покраснение и отек кожи с образованием пузырей.
2	Покраснение и отек кожи, жгучая боль.
3	Покраснение кожи, сильный зуд.

7 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

8 **Какой материал может быть использован в качестве шины?**

1	Ткань.
2	Бинт.
3	Кусок доски.

9 **Как транспортировать пострадавшего при ранении живота и внутреннем кровотечении?**

1	В положении на животе с повернутой набок головой.
2	В полусидячем положении с подложенным под колени валиком.
3	В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами.

10 **Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?**

1	Панадол, кетарол.
2	Димедрол, валериана
3	Фталазол, пенициллин.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 11

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при ранении позвоночника? Пострадавший находится в сознании.**



1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется венозное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?**

1	Уложить на спину, поднять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить больного, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить больного, дать выпить корвалол.

4 **Как начинают бинтование грудной клетки при ранении?**

1	На выдохе с нижних отделов грудной клетки.
2	На вдохе с середины грудной клетки.
3	На выдохе от подмышечных ямок.

5 **В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей таза?**

1	Сидя с разведенными ногами.
2	Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в тазобедренных суставах и слегка развести.
3	Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под крестцом.

6 **Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела?**

1	Заставить пострадавшего кашлять; затем провести серию из 2-3 ударов между лопатками; при неэффективности - провести приём Геймлиха, обхватить пострадавшего сзади.
2	Нанести сильный удар по груди.
3	Очистить ротовую полость, надавить на корень языка и вызвать рвоту.

7 **Укажите верный порядок оказания доврачебной помощи пострадавшему при термическом ожоге.**

1	Медикаментозное обезболивание (из Аптечки автомобильной), повязка, вынос из очага, охлаждение.
2	Повязка, медикаментозное (из Аптечки автомобильной) обезболивание, вынос из очага, охлаждение.
3	Вынос из очага, охлаждение, повязка, медикаментозное обезболивание.

8 **Для того, чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечности, пострадавшего надо:**

1	Посадить.
2	Уложить, конечность приподнять.
3	Поставить на ноги.

9 **Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?**

1	Спиралевидная.
2	Восьмиобразная.
3	Пращевидная.

10 **Укажите для чего предназначен валидол.**

1	Для приёма при высокой температуре.
2	Для приёма при болях в области перелома.
3	Для приёма при болях в области сердца.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 10

На каком рисунке наиболее правильно показана остановка кровотечения у пострадавшего?

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

Укажите правильный способ остановки капиллярного кровотечения.

1	Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложить давящую повязку на место ранения.
3	Применяют оба способа.

Укажите мероприятия первой доврачебной помощи при проникающем ранении глаза.

1	Наложить повязку на оба глаза.
2	Скорейшая доставка в лечебное профилактическое учреждение.
3	Всё перечисленное.

Укажите, как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности.

1	Вправление, обезболивание, иммобилизация.
2	Иммобилизация, обезболивание, холод на место вывиха.
3	Обезболивание, транспортировка в травматологический пункт.

В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей таза?

1	Сидя с разведенными ногами.
2	Лёжа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в тазобедренных суставах и слегка развести.
3	Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под крестцом.

Можно давать пить пострадавшему при ранениях живота?

1	Нет.
2	Можно.
3	Только маленькими глотками.

Какая иммобилизация проводится при переломе ключицы?

1	Шинирование.
2	Косыночная повязка.
3	Применяют оба способа.

Как оказать помощь при ожогах?

1	Вскрыть пузыри, наложить мазевую повязку.
2	Не вскрывая пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3	Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную ватно-марлевую повязку.

Как правильно наложить повязку при проникающем ранении грудной клетки?

1	Наложить асептическую повязку на рану.
2	На рану наложить толстую ватно-марлевую салфетку, накрыть ее воздухо-непроницаемым материалом и фиксировать поддерживающей повязкой.
3	Наложить максимально тугую повязку.

Для чего нужен эластичный бинт?

1	Для наложения повязок при ушибах, растяжениях.
2	Для фиксации шин.
3	Для перевязки ран

...опроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...твета										

Укажите свой номер:

Билет № 9

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при явном повреждении позвоночника в бессознательном состоянии?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется артериальное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе плечевой кости.**

1	Наложить шину с внутренней стороны плеча и туго прибинтовать руку к туловищу.
2	Рука согнута в локте; шина идёт от кончиков пальцев до угла лопатки ее здоровой руки с валиком в подмышечной области и в ладони.
3	Наложить шину от кисти до плечевого сустава.

4 **Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?**

1	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожжённые участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питьё. При потере сознания сделать искусственное дыхание.
3	Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.

5 **Какую повязку использую при травме носа?**

1	Колосовидную.
2	Пращевидную
3	Циркулярную.

6 **В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами рёбер и грудины?**

1	Лёжа на боку.
2	Лёжа на спине.
3	Полусидя.

7 **Как оказать первую помощь при наличии неглубокой раны (ссадины)?**

1	Наложить стерильную повязку.
2	Промыть рану лекарствами.
3	Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.

8 **Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?**

1	Уложить на спину, приподнять ноги, дать понюхать раствор аммиака.
2	Усадить, дать нитроглицерин под язык.
3	Усадить, дать выпить корвалол.

9 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

10 **Укажите, для чего предназначен валидол?**

1	Для приёма при высокой температуре.
2	Для приёма при болях в области перелома.
3	Для приёма при болях в области сердца.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 8

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать в бессознательном состоянии?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется венозное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Как правильно выбрать место для наложения кровоостанавливающего жгута на конечности?**

1	Выше раны.
2	На область раны.
3	Ниже раны.

4 **Как нужно начинать бинтовать грудную клетку при ранении?**

1	На выдохе с нижних отделов грудной клетки.
2	На вдохе с середины грудной клетки.
3	На выдохе от подмышечных ямок.

5 **Какой подручный материал может быть использован в качестве шины?**

1	Ткань.
2	Бинт.
3	Кусок доски.

6 **Какая повязка накладывается при повреждении пальца?**

1	Пращевидная.
2	Спиральная.
3	Шапочка.

7 **Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2	Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3	Синяки, ссадины на коже.

8 **Укажите как оказать помощь пострадавшему при закрытом переломе костей черепа, если он без сознания.**

1	Надеть шейный воротник, уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенным вокруг неё валиком из одежды, приложить холод.
2	Уложить пострадавшего на спину, дать питьё, на голову положить компресс.
3	Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик.

9 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени.**

1	Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава.
2	Наложить две шины с наружной и внутренней стороны ноги от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов.
3	Наложить одну шину с внутренней стороны ноги от стопы до коленного сустава.

10 **Какие средства можно применить для уменьшения боли при переломе?**

1	Валидол.
2	Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.
3	Корвалол.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 7

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при ранении конечностей? Пострадавший находится в сознании.**



1	Только на рисунке 1.
2	Только на рисунке 2.
3	На рисунке 1 и 2.

2 **На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) при артериальном кровотечении летом?**

1	Не более 2,5 часов.
2	Не более 1 часа.
3	Не более 2 часов.

3 **Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?**

1	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожжённые участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2	Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питьё. При потере сознания сделать искусственное дыхание.
3	Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.

4 **Какая повязка накладывается на плечо?**

1	Колосовидная.
2	Шапочка.
3	Спиралевидная.

5 **Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?**

1	Обложить голень валиками из одежды.
2	Прибинтовать к здоровой ноге.
3	Туго забинтовать.

6 **В каком положении нужно эвакуировать пострадавшего с вывихами костей верхних конечностей?**

1	Лёжа.
2	Стоя.
3	Сидя.

7 **Как снять с пострадавшего высокий сапог?**

1	Стянуть.
2	Разрезать спереди.
3	Разрезать сзади по шву.

8 **Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

9 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

10 **В каких случаях применяется энтеродез или активированный уголь?**

1	При болях в животе.
2	При высокой температуре.
3	При отравлении.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 6

1 **На каком рисунке правильно показан метод восстановления дыхания и кровообращения у пострадавшего?**

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения.**

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

3 **Какой метод остановки кровотечения необходимо применять в первую очередь при артериальном кровотечении?**

1	Жгут (закрутка)
2	Метод максимального сгибания конечности.
3	Пальцевое прижатие сосуда.

4 **Первая помощь при закрытой травме органов брюшной полости.**

1	Обезболивание.
2	Обильное питьё, успокоительные препараты.
3	Положить холод на живот, срочная госпитализация.

5 **Первая помощь при общем переохлаждении:**

1	Растереть пострадавшего жёстким материалом или снегом.
2	Создать условия для общего согревания, укутать одеялом, дать тёплое питьё.
3	Сделать массаж, растереть спиртом.

6 **Как оказать доврачебную помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном ушибе живота?**

1	Уложить пострадавшего на спину, дать тёплый чай и в этом положении транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2	Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учреждение в положении лёжа на боку с согнутыми в коленях ногами.
3	Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до ближайшего медицинского учреждения.

7 **Какая повязка накладывается при проникающих ранениях глазного яблока?**

1	Спиралевидная.
2	Бинокулярная.
3	Теплоизолирующая.

8 **Укажите подручные средства, иммитирующие мягкие носилки.**

1	Широкие доски, двери.
2	Покрывало, большой кусок плотной ткани, одеяло.
3	Всё перечисленное.

9 **Укажите основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости.**

1	Наложить сбоку одну шину от стопы до середины бедра.
2	Наложить три шины: одну по задней поверхности ноги – от поясницы до кончиков пальцев, вторую – сбоку, от стопы до подмышечной впадины, третью – внутри, от стопы до паха.
3	Наложить по бокам две шины – от стопы до конца бедра.

10 **Укажите для каких целей предназначен раствор йода или бриллиантовой зелени.**

1	Для обработки кожи вокруг раны.
2	Для обработки всей поверхности раны.
3	При ожогах, вызванных щёлочью.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 5

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать при значительной кровопотере?**



1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Укажите правильный способ остановки капиллярного кровотечения.**

1	Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложить давящую повязку на место ранения.
3	Применяют оба способа.

3 **Неотложная помощь при носовом кровотечении?**

1	Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку.
2	Нагнуть голову больного вперёд, холод на переносицу, тампонада.
3	Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, тампонада.

4 **Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами?**

1	Промыть поражённое место мыльным раствором или 2% раствором столовой соды, наложить асептическую повязку.
2	Обработать поражённое место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
3	Промыть поражённое место водой и наложить повязку из чистой материи.
4	Применяют способы 2 или 3.

5 **Как оказать помощь на месте при простой и неглубокой ране?**

1	Наложить стерильную повязку.
2	Промыть рану лекарством.
3	Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.

6 **Какое лекарственное растение можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?**

1	Подорожник, берёзовый лист.
2	Корень валерианы, цветы ландыша.
3	Листья мать-и-мачехи.

7 **Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей шины?**

1	Да.
2	Нет.
3	Одежду нужно снимать только ниже пояса.

8 **Какая повязка накладывается на бедро?**

1	Чепец.
2	Дезо.
3	Спиралевидная (ползучая).

9 **Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?**

1	От кончиков пальцев до локтевого сустава.
2	От кончиков пальцев до верхней трети плеча.
3	От лучезапястного сустава до верхней трети плеча.

10 **Укажите для чего применяется S-образная трубка.**

1	Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2	Чтобы напоить пострадавшего, для предупреждения рвотных масс.
3	Для проведения искусственного дыхания, для устранения западения языка, для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 4

1 **На каком из рисунков наиболее правильно показан метод остановки кровотечения из носа?**

Рис. 1 Рис. 2

1	На рисунке 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Виды кровотечений:**

1	Из носа, руки, головы, ноги, тела.
2	Артериальное, венозное, капиллярное, смешанное, внутреннее.
3	Артериальное, венозное, капиллярное.

3 **Какие приёмы первой медицинской помощи применяются при внутреннем кровоизлиянии или подозрении на него?**

1	Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную повязку, обеспечить покой.
2	Дать холодной воды.
3	Дать горячего чая.

4 **Как правильно применить бактерицидные салфетки?**

1	Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку.
2	Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку.
3	На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырём или бинтом.

5 **Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой?**

1	Промыть поражённое место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку.
2	Промыть поражённый участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, наложить асептическую повязку.
3	Промыть поражённый участок водой и наложить повязку из чистой материи.
4	Применяют способы 2 или 3.

6 **Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности?**

1	Вправление, обезболивание, иммобилизация.
2	Иммобилизация, обезболивание, холод на место вывиха.
3	Обезболить, наложить транспортную шину, доставить в медицинское учреждение.

7 **Какая повязка накладывается при повреждении лба?**

1	Шапочка.
2	Спиралевидная.
3	Крестообразная.

8 **Основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах:**

1	Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца.
2	Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха.
3	Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить холодный компресс на грудь.

9 **Как снять с пострадавшего высокий сапог?**

1	Стянуть.
2	Разрезать спереди.
3	Разрезать сзади по шву.

10 **Для чего предназначен нашатырный спирт?**

1	Для обработки ран.
2	Для наложения согревающего компресса.
3	Для вдыхания при обмороке и угаре.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Билет № 3

Укажите свой номер:

1 **На каком рисунке правильно показан приём извлечения пострадавшего из автомобиля при повреждении у него позвоночного столба?**

1	Только на рисунке 1.
2	Только на рисунке 2.
3	Только на рисунках 1 и 2.

2 **Чем характеризуется капиллярное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) при артериальном кровотечении зимой?**

1	Не более 2.5 часов.
2	Не более 30 минут.
3	Не более 2 часов.

4 **Что можно использовать в качестве импровизированного кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении?**

1	Метод максимального сгибания конечности.
2	Закрутку из полосы материи.
3	Проволоку.

5 **Какие признаки открытого перелома?**

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности
2	Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров.
3	Синяки, ссадины на коже.

6 **В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без сознания?**

1	Полусидя с повернутой набок головой.
2	В стабильном боковом положении.
3	Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды.

7 **Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?**

1	Спиралевидная.
2	Восьмиобразная.
3	Колосовидная.

8 **Первую доврачебную помощь имеют право оказывать:**

1	Случайный прохожий.
2	Сотрудник ГИБДД.
3	Врач.
4	Все вышеперечисленные.

9 **Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполненные сукровицей (кровянистой жидкостью) или некроз тканей?**

1	Первой степени.
2	Второй степени.
3	Третьей степени.

10 **Укажите для чего применяется S-образная трубка.**

1	Для фиксации нижней челюсти при переломе.
2	Чтобы напоить пострадавшего, для предупреждения рвотных масс.
3	Для проведения искусственного дыхания, для устранения западения языка, для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 2

На каком из рисунков наиболее правильно показан метод остановки кровотечения из носа?

1	На рисунках 1 и 2.
2	Только на рисунке 2.
3	Только на рисунке 1.



Рис. 1 Рис. 2

Чем характеризуется венозное кровотечение?

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения.

1	Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута.
2	Наложение на рану поддерживающей повязки.
3	Приподнятое положение конечности.

Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?

1	Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2	Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3	Синяки, ссадины на коже.

Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?

1	Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности.
2	Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой конечности.
3	Наложить на рану стерильную повязку, провести транспортную иммобилизацию конечности, дать обезболивающее лекарство и организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

Укажите подручные средства, иммитирующие мягкие носилки.

1	Широкие доски, двери.
2	Покрывало, большой кусок плотной ткани, одеяло.
3	Всё перечисленное.

Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью?

1	Первой степени.
2	Второй степени.
3	Третьей степени.

Какая повязка накладывается при повреждении затылка?

1	Крестообразная.
2	Спиралевидная.
3	Расходящаяся.

Перечислите мероприятия доврачебной помощи пострадавшему с переломом костей стопы.

1	Дать обезболивающие лекарства, транспортировать в больницу.
2	Шинировать, обезболить, транспортировать.
3	Транспортировать, обезболить, шинировать.

Какое средство нужно применять при стрессовой реакции?

1	Развести 30 капель корвалола в 50 мл воды и дать выпить больному.
2	Дать больному под язык таблетку валидола.
3	Дать больному таблетку анальгина.

вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 1

1 **На каком рисунке показано положение пострадавшего, в котором рекомендуется его транспортировать в бессознательном состоянии?**

1	На рисунке 1 и 2.
2	Только на рисунке 1.
3	Только на рисунке 2.

2 **Чем характеризуется артериальное кровотечение?**

1	Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску.
2	Кровь из раны вытекает непрерывно сплошной струёй тёмно-красного цвета.
3	Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

3 **Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения?**

1	Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности.
3	Применяются оба способа.

4 **Какое кровотечение считается наиболее опасным?**

1	Капиллярное.
2	Венозное.
3	Артериальное.

5 **Перечислите признаки вывиха в суставе.**

1	Боль в суставе, изменение его формы, ограничение движения, изменение длины конечности.
2	Боль в суставе, припухлость, патологическая подвижность.
3	Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура тела.

6 **Укажите как наложить транспортную шину при травме кисти.**

1	По ладонной поверхности от кончиков пальцев до середины предплечья с валиком под кистью.
2	С обеих сторон кисти и прибинтовать.
3	Применяются оба способа.

7 **Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?**

1	Колосовидная.
2	Спиралевидная.
3	Чепец.

8 **Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются выраженная гиперемия (покраснение кожи) и отёк кожи?**

1	Первой степени.
2	Второй степени.
3	Третьей степени.

9 **При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках:**

1	Только при оказании первой медицинской помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
2	При оказании помощи любому пострадавшему.
3	Необязательно, так как неудобно.

10 **Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?**

1	Панадол, кетарол.
2	Димедрол, валериана
3	Фталазол, пенициллин.

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№ ответа										

Укажите свой номер:

Билет № 30

На каком рисунке правильно показан метод определения, жив или мёртв пострадавший?

1 2 3

1	На рисунках 1, 2, 3.
2	На рисунке 3.
3	На рисунке 2.

Укажите правильный способ остановки капиллярного кровотечения.

1	Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание конечности в суставе.
2	Наложить давящую повязку на место ранения.
3	Применяют оба способа.

Укажите кто может оказывать доврачебную помощь.

1	Случайный прохожий.
2	Сотрудник ГИБДД.
3	Врач.
4	Все перечисленные.

Укажите основные правила наложения транспортной шины при перелом бедренной кости.

1	Наложить сбоку одну шину от стопы до середины бедра.
2	Наложить три шины: одну по задней поверхности ноги – от поясницы до кончиков пальцев, вторую – сбоку, от стопы до подмышечной впадины, третью – внутри, от стопы до паха.
3	Наложить по бокам две шины – от стопы до конца бедра.

В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей таза?

1	Сидя с разведёнными ногами.
2	Лёжа на жёсткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в тазобедренных суставах и слегка развести.
3	Лёжа на жёсткой поверхности с разведёнными ногами и валиком под крестцом.

Можно давать пить пострадавшему при ранениях живота?

1	Нет.
2	Можно.
3	Только маленькими глотками.

Какая иммобилизация проводится при переломе ключицы?

1	Шинирование.
2	Косыночная повязка.
3	Применяют оба способа.

Как оказать помощь при ожогах?

1	Вскрыть пузыри, наложить мазевую повязку.
2	Не вскрывая пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3	Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную ватно-марлевую повязку.

Как правильно наложить повязку при проникающем ранении грудной клетки?

1	Наложить асептическую повязку на рану.
2	На рану наложить толстую ватно-марлевую салфетку, накрыть ее воздухо-непроницаемым материалом и фиксировать её поддерживающей повязкой.
3	Наложить максимально тугую повязку.

Для чего нужен эластичный бинт?

1	Для наложения повязок при ушибах, растяжениях.
2	Для фиксации шин.
3	Для перевязки ран

опроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вета										